

## ציפור הסוכר הסגולה / האניקרופר



מאת ג'ון רובינסון ©

תורגם ע"י Zigi ©

(הערת המתרגם: השם הנוסף ל Honeycreeper האניקרופר הוא ציפור סוכר)

תערובת נקטר הראשונה הזו תחזיק אותם בגבול הבריאות הסבירה אך דיאטת הנקטר הטובה ביותר שמצאנו היא זו:

### מתכון שני להכנת נקטר:

- 3 כפות של תחליף חלב מבוסס סויה לתינוקות (Wysoy)
- 7 כפיות של סוכר לבן
- שמינית (1/8) של כפית של אבקת דבורים
- רבע (1/4) כפית של מנטרל שמרים
- תחילה ערבב את הכל על יבש טוב טוב
- לאחר מכן הוסף שמינית (1/8) כפית של ויטמין B12
- כפית אחת של סירופ של מולטי ויטמין
- ערבב הכל עם מעט מיים רותחים עד שהכל יתמוסס יחד בצורה שווה
- ואז הוסף עד ליטר אחד של מיי ברז רגילים

**אזהרה:** אם תוסיף יותר מידי ויטמין B12 זה עלול להרעיל את הציפורים !!

ציפור הסוכר הסגולה באה מרוב צפון דרומה של יבשת אמריקה ומחלק מהאיים הקריביים

**תתי-מין:** יש 5 תתי מין אבל ההבדלים ביניהם לא ברורים

**צבע הניצוי:** זכר ציפור הסוכר הסגולה, כפי ששמו מרמז, הוא סגול בהיר חוץ מרצועות העין, הסנטר והגרונן שהם בעלי צבע שחור.

הנקבה היא בעיקר ירוקה כעלה, מלמעלה ומלמטה היא ירוקה בהירה עם תילום ירקרק.

הצעירים נראים כמו הנקבה.

זכרים לא מתכסים בניצוי בוגר עד שהם מגיעים לגיל של 18-24 חודש ים. נראה שזכרים מגיעים לפוריות מינית כשהניצוי הבוגר שלהם מגיע ל 3/4 מהניצוי המלא שלהם.

**דיאטה:** דיאטת נקטר הוא התזונה העיקרית לציפורים אלו אבל גם בתוספת פירות כגון אגסים, בננות ורימונים. מזון חי בצורת תולעי קמח, תולעי שעווה קטנות וזבובי פירות הם חיוניים כמגוון לציפור אוכלת חרקים זו.

יש שתי צורות של תערובת נקטר שאנו משתמשים, הראשונה מכילה:

### מתכון ראשון להכנת נקטר:

- 1 כף של של תחליף חלב מבוסס סויה לתינוקות (Wysoy)
- 2 כפות של אבקת גלוקן
- לערבב יחד עם מעט מיים רותחים עד שהכל יתמוסס יחד
- ואז להוסיף 500 מיליליטר של מים רגילים מהברז

**מאפיינים יחודיים:** הן ציפורים מאוד אקטיביים והזכרים תמיד שרים, אולם הם אינם רעשנים. הן אינם מתאימים למגדלים מתחילים למרות שאני הייתי ממליץ אותם לזה שהיה רוצה להתחיל עם ציפורים הניזונות מנקטר, לאחר שצבר נסיון עם רכי מקור אחרים.

**תערוכה:** ניצחתי בהרבה תערוכות וניצחתי בקטגוריית הצבע הטובה ביותר לרכי מקור באיזור. התערוכה שלי כוללת טנג'רים, ציפורי סוכר, צופיות, נילטאבס, לוריקיט, וכמה פינקים נדירים. כולם הוצגו בכלובים גדולים ותמיד היו להם פרחים שסידרתי בפינות הכלוב.

הייתי רוצה לדעת על כל אינפורמציה חדשה על נושא זה או על הציפורים האחרות שלי.

אם תרצה לשאול שאלה בבקשה תרגיש חופשי לשלוח לי אימייל בנושא (הערות המתרגם: **באנגלית בלבד**)  
[softbillman@hotmail.co.uk](mailto:softbillman@hotmail.co.uk)

**מגורים:** הן יהיו די מרוצות בכלוב גדול בתוך הבית בגודל של 1.2 מטר. אבל אני מעדיף לנסות ולהחזיק את הציפורים הללו בווליר לבדם, זה נותן להן את הסיכוי הטוב ביותר לריבוי. הן יכולות לקבל גישה לווליר מחוץ לבית למשך חודשי הקיץ בתנאי שהטמפרטורות לא ירדו מתחת ל-25.5 מעלות צלזיוס. אסור לתת לטמפרטורות לרדת מתחת ל-25.5 מעלות צלזיוס במשך חודשי החורף.

הן יתמזגו די בשמחה עם סוגי ציפורים אחרות כשהן לא במצב ריבוי, אולם בזמני הריבוי שלהם עדיף לבודד אותן או שהן עשויות להיות מעט אגרסיביות ומגוננות יתר על המידה על הקן שלהן.

חייבים לאפשר להן גישה למים ומיי רחצה כל הזמן מאחר והן מאוד אוהבות להתרחץ.

**הריבוי:** ווליר או כלוב לבדם ישיג את תוצאות הריבוי הטובות ביותר. הן ישתמשו בקן של קופסת פינקים מרובעת או סלסלה שם הם יבנו קן קטן בצורת גביע העשוי כולו מסיבי קוקוס. ההטלה הממוצעת שלהן היא בדרך כלל 2 ביצים והן בוקעות בערך לאחר 14 ימים. הגוזלים עוזבים את הקן לאחר 2 ימים נוספים בערך. כשייש להם ביצים בקן הכי טוב להתחיל לספק להן ספוגית אצבע ספוגה כולה בנקטר עד שהן יפרחו מהקן. תולעי קמח קטנים ולבנים ושפע של זבובי פירות הם חיוניים בכדי שהגוזלים הללו ישרדו את תקופת הבגרות.

**עצות טיפים:** כשאתה רוכש רכי מקור, ולא משנה איזה, אל תדאג יותר מידי למצב הניצוי שלהם, אפילו אם הציפורים נטולות נוצות לחלוטין, עם הזמן הנוצות יגדלו חזרה. אולם מה שכן תבדוק שאין צלקות על העור של הציפורים מאחר וצלקות שכאלו עשויות להגרם מזיקי הנוצות שניזון מעבר לכל תקנה. הציפורים חייבות להיות בעלות עיניים עגולות בהירות ונקיות, והן צריכות להראות די אקטיביות, הימנע מציפורים מנופחות ומנומנות, ציפורים אלו בדרך כלל לא ישרדו.

כשאתה רוכש אותן לראשונה יש לבודד אותן ולא לשים אותן ישר בווליר עם אחרות לתקופה של בערך שבועיים. זה יאפשר לכל מחלה שאולי דוגרת להפוך לגלויה מבלי להדביק ציפורים אחרות בזיהום זה.